

Разработано ООО «Биолит»



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СХЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ
ООО «БИОЛИТ»**

РОССИЯ, Г. ТОМСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рекомендуемая схема при нарушениях жирового обмена и в комплексной программе снижения веса4
2. Рекомендуемая схема для повышения защитных сил организма и профилактики простудных заболеваний5
3. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ, гриппа6
4. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы (при повышенном артериальном давлении).....7
5. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы (при пониженном артериальном давлении).....8
6. Рекомендуемая схема для реабилитации после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (постинсультное состояние).....9
7. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии варикозной болезни 10
8. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии геморроя 11
9. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии сахарного диабета 12
10. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии хронических гастритов, дуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 13
11. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей 14
12. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии описторхоза 15
13. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии лямблиоза 16

СОДЕРЖАНИЕ

14. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии туберкулеза 18
15. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии патологии опорно-двигательного аппарата 19
16. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний периферической нервной системы (невриты, радикулиты) 20
17. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы у женщин 21
18. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин 22
19. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии миомы матки 23
20. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии климакса 24
21. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний мочеполовой системы у мужчин 25
22. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии онкологических заболеваний 26
23. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии мастопатии 27
24. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы 28

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЖИРОВОГО ОБМЕНА И В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Ширлайн	В течение 4 недель 3 раза в неделю**	2 ч.л. растворить в 200 мл воды, 1 раз в день утром натощак
Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день
*Токсидонт-май (Экстракт корня лопуха) или Токсидонт-май с бро- мелайном и папаином	4–6 недель 4 недели	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 саше 1 р./день
*Галега-Нова или Галена-Нова форте	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день

Примечание:

* - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

Общие рекомендации

- В питании ограничить сладости, мучное, то есть углеводсодержащие продукты.
- Ограничить прием пищи после 18 часов.
- Употреблять несладкие фрукты и овощи.
- Исключить острые приправы, ограничить употребление соли.
- Увеличить физические нагрузки (пешие прогулки, плавание и т. д.).

Рекомендуемое количество средств по схеме

ШИРЛАЙН (120 г) 1 УПАКОВКА
 ГЕПАТОСОЛ (90 г) 1 УПАКОВКА
 или ГЕПАТОСОЛ-форте (90 капсул) ... 1 УП.
 ГАЛЕГА-НОВА (90 г) 2-3 УПАКОВКИ
 или ГАЛЕГА-НОВА ФОРТЕ... 1-2 УПАКОВКИ
 ТОКСИДОНТ-МАЙ или ЭКСТРАКТ КОРНЯ
 ЛОПУХА (75 мл) 4–6 УПАКОВОК
 или ТОКСИДОНТ-МАЙ с бромелайном
 и папаином в саше..... 3 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и длительности приема по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
**Тонизид	4 недели	По 1 ч.л. утром до еды
*Флорента или Флорентина	4 недели	Развести водой в 5–10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутрь; по 1–2 капли в каждый но- совой ход 2 раза в день
Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Флорента спрей	в сезон эпидемии гриппа и ОРВИ	Распылять в помещении 2–3 раза в день, обрабатывать полость рото-глотки 2–3 раза в день.

Примечание:

* - основные средства

** - не использовать при гипертонии, аритмии, высокой температуре, бессоннице.

Общие рекомендации

- По возможности совершать прогулки на свежем воздухе, на лыжах.
- Избегать контакта с больными гриппом и ОРВИ.
- Принимать контрастный душ.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ТОНИЗИД (90 г) 1 УПАКОВКА
 ФЛОРЕНТА (200 мл)
 или ФЛОРЕНТИНА (200 мл) 1 ФЛАКОН
 ФЛОРЕНТА спрей (50 мл) 2 ФЛАКОНА
 ВИТАМИКС (120 г) 2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок и
средств по рекомендации Вашего кон-
сультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ОРВИ, ГРИППА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Флорента или Флорентина	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутрь; по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день;
*Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Экстракт подорожника	2-4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл теплой воды
Эплир масляный – (при насморке)	7-14 дней****	По 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день
*Флорента крем	7-14 дней****	Растирать грудную клетку
*Флорента спрей	7-14 дней	Распылять в помещении 2 – 3 раза в день, обрабатывать полость рото-глотки 2-3 раза в день
Эсобел гранулы	7-14 дней****	Растворить 1 ч.л. гранул в 1 ст. теплой воды, полоскать горло 5-6 раз в день, закапывать в нос 3 – 4 раза в день
Тонизид (в период выздоровления)	4 недели**	По 1 ч.л. утром до еды
*Рейши - Кан	3-4 недели***	По 1 ч.л. 2 раза в день

Примечание:

* - основные средства.

** - не использовать при гипертонии, аритмии, высокой температуре, бессоннице.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

**** - длительность применения зависит от выраженности симптомов.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ФЛОРЕНТА (200 мл)
или ФЛОРЕНТИНА (200 мл)2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА спрей (50 мл)2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА крем (30 г)1-2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г)2 УПАКОВКИ
РЕЙШИ-КАН (100 г) 1 УПАКОВКА
ЭКС-Т ПОДОРОЖНИКА
(75 мл)2-4 ФЛАКОНА
ЭПЛИР 1% масляный р-р
(10 мл)1 ФЛАКОН
ТОНИЗИД (90 г) 1 УПАКОВКА
ЭСОБЕЛ (50 г) 1 УПАКОВКА

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (при повышенном артериальном давлении)

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Аргозид или Марикад	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 2 капсулы 3 р./день
*Флавигран-очанка, Флавигран	4–6 недель, 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Растворить в 5-10 раз, по 1 ст. л. 3 р./день внутрь
Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день
Уролизин или Уролизин-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 р./день
*Климатон	8–12 недель, через месяц курс повторить	По 1 ч.л. 3 раза в день и на ночь
*Рейши - Кан	3–4 недели***	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * – основные средства.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Общие рекомендации

- Избегать стрессовых ситуаций.
- Дозировать физическую нагрузку, совершать прогулки на свежем воздухе 1–2 часа в день.
- Соблюдать рациональное питание, ограничить прием соли.
- Исключить курение.

Рекомендуемое количество средств по схеме

АРГОЗИД (120 г) или2 УПАКОВКИ
МАРИКАД (90 капсул)2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ
(90 КАПСУЛ)1 УПАКОВКА
КЛИМАТОН (90 г)4-6 УПАКОВОК
УРОЛИЗИН (120 г)2 УПАКОВКИ
или УРОЛИЗИН-ФОРТЕ
(90 КАПСУЛ)1 УПАКОВКА
ФЛАВИГРАН или ФЛАВИГРАН–
ОЧАНКА (120 г)2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
РЕЙШИ - КАН (100 г)1–2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего кон
сультанта.*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
(при пониженном артериальном давлении)**

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1–2 ст.л., 3 раза в день
*Климатон плюс	8–12 недель, пере- рыв на 1 месяц, курс повторить	По 1 ч.л. 3 раза в день
* Флавигран-очанка	4–6 недель, 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день
*Тонизид	4 недели, 3–4 курса в год**	По 1 ч. л. утром до еды

Примечание:

* – основные средства.

**Рекомендуемое количество
средств по схеме**

ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ
(90 капсул)..... 1 УПАКОВКА
КЛИМАТОН ПЛЮС (90 г) ... 4-6 УПАКОВОК
ТОНИЗИД (90 г) 1 УПАКОВКА
ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА
(120 г)2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ПОСТИНСУЛЬТНОЕ СОСТОЯНИЕ)

СРЕДСТВО	ДЛИТ-СТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Венорм или Венорм-форте или Марикад	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капсуле 3 раза в день По 2 капсулы 3 раза в день
*Флавигран-очанка или Флавигран	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Аргозид (при повышенном АД) или Аргозид-форте	4 недели**	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капсуле 3 раза в день
*Рейши-Кан	3–6 недель***	По 1 ч.л. 2 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
Гепатосол или Гепатосол-форте или Семена солянки холмовой	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капсуле 3 раза в день По 3 капсулы 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при гипотонии.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Общие рекомендации

- Отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение).
- Ежедневно спать днем (1-1,5 часа).
- Гулять на свежем воздухе (не менее 1,5-2 часов в день).
- Питаться предпочтительно растительными продуктами.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ.....1 УПАКОВКА
или СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ
(190 капсул)1 УПАКОВКА
АРГОЗИД (120 г)2 УПАКОВКИ
или АРГОЗИД-ФОРТЕ1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
РЕЙШИ-КАН (100 г)1–2 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ (120 г).....2 УПАКОВКИ
или ВЕНОРМ-ФОРТЕ.....1 УПАКОВКА
или МАРИКАД (90 капсул)2 УПАКОВКИ
ФЛАВИГРАН или ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА (120 г)2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

СРЕДСТВО	ДЛИТ-СТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Венорм гранулы или Венорм-форте или Марикад	4 недели, перерыв на 6 недель, курс повторить	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день По 2 капс. 3 р./день
*Венорм крем	Одновременно с Венормом или Мари- кадом	2 р./день наносить на пораженный участок
Гепатосол или Гепатосол-форте или Семена солянки холмовой	4 недели, курс 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день По 3 капсулы 3 р./день
*Рейши - Кан	3–6 недель***	По 1 ч.л. 2 р./день
Флавигран	3–4 недели, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 р./день
Ширлайн (при нали- чии запоров)	2 недели**	2 ч.л. растворить в 1 стакане воды, прини- мать утром натощак 3 раза в неделю

Примечание: * – основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

*** – заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Общие рекомендации

- Снизить массу тела до оптимального уровня.
- Исключить прием горячих ванн, посещение саун без консультации врача.
- Размещать ноги в приподнятом положении во время сна.
- Носить обувь на каблуке не выше 3–4 см.
- Регулярно обливать ноги контрастным душем.
- Носить эластичные колготки.
- Часто изменять положение ног при длительном сидении.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г)2 УПАКОВКИ
или ВЕНОРМ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
или МАРИКАД (90 капсул)2 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл)3 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
или СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ
(190 капсул) 1 УПАКОВКА
ФЛАВИГРАН (120 г) 1 УПАКОВКА
РЕЙШИ - КАН (100 г)1–2 УПАКОВКИ
ШИРЛАЙН (120 г) 1 УПАКОВКА

*Возможна вариация дозировок и
средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕМОРРОЯ

Период	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	СХЕМА ПРИЕМА
Период обострения	*Токсидонт–май или Семена лопуха	7–10 дней	По 1 ч.л. 2 раза в день (растворить в 100 мл теплой воды) По 3 капсулы 3 раза в день
	*Эплир масляный	7–10 дней	Смазывать воспаленные геморроидальные узлы 2–3 раза в день
	Флорента	Весь период обострения	Гигиеническое обмывания теплым раствором после стула (разведение 1:10)
	*Ахиллан	7–10 дней	По 1 ч.л. 3 раза в день
Период выздоровления	*Венорм (гранулы) или Венорм-форте	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
	*Венорм крем	2–4 недели	Наносить на геморроидальные узлы 2 раза в день
	Флорента	Весь период обострения	Гигиеническое обмывания теплым р-ром после стула (разведение 1:10)
Ремиссия (вне обострения)	*Витамикс	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ширлайн с лохейном (при наличии запоров)	2 недели**	2 ч.л. растворить в 1 стакане воды, принимать утром натощак, 3 раза в неделю

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

Общие рекомендации

- Устранить запоры.
- Нормализовать вес.
- Соблюдать личную гигиену.
- Исключить прием горячих ванн, посещение саун без консультации врача.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ТОКСИДОНТ – МАЙ (75 мл) или СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул) 1 УПАКОВКА
 АХИЛЛАН (90 г) 1 УПАКОВКА
 ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г) 3 УПАКОВКИ
 или ВЕНОРМ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
 ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл) 1 УПАКОВКА
 ЭПЛИР 1% масляный р-р (10 мл) 2 ФЛАКОНА
 ФЛОРЕНТА (200 мл) 2 ФЛАКОНА
 ШИРЛАЙН С ЛОХЕЙНОМ (30 г) 2 УПАКОВКИ
 ВИТАМИКС (120 г) 1 УПАКОВКА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Гепатосол на сорбите или Гепатосол-форте	4 недели, 2-3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
*Галега-Нова или Галега-Нова форте	4 недели, 1-3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
Флавигран	4 недели, 4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Венорм на сорбите или Венорм-форте	4 недели, 4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
Венорм крем	4 недели, 4 курса в год	Наносить на стопы 2 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	1 месяц, 2-3 курса в год	По 0,5 ч.л. 2-3 раза в день По 3 капсулы 3 раза в день
Бетулан (ванночки для ног)	1-2 раза в неделю, постоянно	40 г соли / 1 л теплой воды, 20-25 минут
*Рейши - Кан	3-6 недель, 1-2 курса в год	По 1 ч.л. 2 раза в день
Флорента	4 недели, 4 курса в год	Развести в 5-10 раз, по 1 ст.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Соблюдать назначения врача и специальную диету (стол № 8).
- Не допускать резких колебаний глюкозы в крови.
- Тщательно ухаживать за кожей, особенно на ногах.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ГЕПАТОСОЛ на сорб. (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
ГАЛЕГА-НОВА (90 г)2-6 УПАКОВОК
или ГАЛЕГА-НОВА ФОРТЕ..... 1 УПАКОВКА
ФЛАВИГРАН (120 г)2 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ на сорбите (120 г) ...2 УПАКОВКИ
или ВЕНОРМ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл)2 УПАКОВКИ
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)1 ФЛАКОН
или СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 капсул) 1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
РЕЙШИ - КАН (100 г)1-2 УПАКОВКИ
БЕТУЛАН (40 г) на 1 месяц8 УПАКОВОК

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ, ДУОДЕНИТА, ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Ахиллан или Ахиллан-форте	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	4–6 недель, 2 курса в год	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды. По 3 капсулы 3 раза в день
Ширлайн**	10–15 дней	1 ч.л. растворить в 200 мл воды, принимать по 70 мл 3 раза в день
Экстракт подорожника***	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

*** – при гастритах с пониженной кислотностью.

Общие рекомендации

- Исключить курение.
- Ограничить применение алкогольных напитков.
- Питаться часто, дробно, до 6 раз в сутки.
- Пунктуально выполнять рекомендации по оздоровлению желудочно-кишечного тракта.

Рекомендуемое количество средств по схеме

АХИЛЛАН (90 г)

- при гастритах:2 УПАКОВКИ

- при язвенной болезни:3 УПАКОВКИ

или АХИЛЛАН-ФОРТЕ 1-2 УПАКОВКИ

ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ

или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА

ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА

ШИРЛАЙН (120 г) 1 УПАКОВКА

ТОКСИДОНТ–МАЙ (75 мл)2 ФЛАКОНА

или СЕМЕНА ЛОПУХА

(190 капсул) 1 УПАКОВКА

ЭКСТРАКТ ПОДРОЖНИКА

(75 МЛ)4–6 ФЛАКОНОВ

*Возможна вариация дозировок
и длительности приема по рекоменда-
ции Вашего консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Гепатосол или Гепатосол-форте или *Липроксол	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день По 1 ч.л. 3 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	4 недели 3 недели	По 0,5 ч. л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды По 3 капсулы 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5 – 10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
Витамикс	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Уролизин (при ЖКБ) или Уролизин-форте	4 недели, 3 курса в год (при вели- чине камней не более 5 мм)	По 1 ч.л. 4 раза в день По 1 капс. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Соблюдение диеты (ограничение жирного, острого, жареного, мучного, алкогольных напитков).
- Питаться часто, дробно, до 6 раз в сутки.
- Пунктуально выполнять рекомендации по оздоровлению желудочно-кишечного тракта.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
или ЛИПРОКСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)2 ФЛАКОНА
или СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 капсул) 1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
ВИТАМИКС (120 г)2 УПАКОВКИ
УРОЛИЗИН (120 г)2 УПАКОВКИ
или УРОЛИЗИН-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОПИСТОРХОЗА

ЭТАП	СРЕДСТВО	ДЛИТ. ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
1. Подготови- тельный	*Гепатосол или Гепатосол-форте	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
	*Ахиллан или Ахиллан-форте	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
	Флорента	2 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
2. Воздействие на паразита	*Экорсол+ (Экорсол на- питок чайный, гранулы) или Экорсол-форте+ или Популин с дигидро- кверцетином (Популин напиток чайный)	1 неделя	По 3 ч.л. 3 раза в день взрос- лым; детям 3-6 лет-1/3 дозы, 6 - 12 лет -2/3 дозы взрослого. По 3 капсулы 3 раза в день
	*Гепатосол или Гепатосол-форте	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Токсидонт-май (Экстракт корня лопуха)	1 неделя	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
3. ***Восстанови- тельный	*Гепатосол или Гепатосол-форте	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
	*Ахиллан или Ахиллан-форте	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ширлайн	2 недели**	Дюбажи 1-2 раза в неделю
	Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
	Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание:

* - основные средства.

** – не применять при желчекаменной бо-
лезни, заболеваниях желудочно-кишечного
тракта в стадии обострения, подозрении на
новообразование.

***Рекомендуется на 3 этапе в схему вклю-
чить энтеросорбент (4-5 дней). Контроль
эффективности через 6 месяцев после
окончания схемы: 3-хкратно кал на яйца опи-
сторхисов, дуоденальное зондирование.

**Обязательна консультация с леча-
щим врачом (в т.ч. при наличии желче-
каменной болезни).**

Общие рекомендации

- Соблюдать правильную технику раздел-
ки рыбы.
- Выдерживать правила термической об-
работки рыбы.
- Не пробовать сырую рыбу и рыбный
фарш на соленость и готовность.
- Выбирать надежный способ соления
рыбы.
- Не давать сырую рыбу домашним жи-
вотным.

Рекомендуемое количество средств по схеме в комплексной терапии описторхоза (с. 15)

ГЕПАТОСОЛ (90 г)3 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ2 УПАКОВКИ
АХИЛЛАН (90 г)2 УПАКОВКИ
или АХИЛЛАН-ФОРТЕ2 УПАКОВКИ
ШИРЛАЙН (30 г)1 УПАКОВКА
ЭКОРСОЛ+ или ЭКОРСОЛ
(напиток чайный) (42 г)3 УПАКОВКИ
(для взрослых)
или ЭКОРСОЛ-форте+1 УПАКОВКА
или ПОПУЛИН с дигидрокверцетином
или ПОПУЛИН (напиток чайный)
(200 мл)1 ФЛАКОН
ТОКСИДОНТ-МАЙ
или ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА
(75 мл)1 ФЛАКОН
ВИТАМИКС (120 г)2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЛЯМБЛИОЗА

ЭТАП	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
1. Подготовительный	*Ахиллан	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Гепатосол	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
2. Воздействие на паразита	*Танаксол или Танаксол плюс (напиток чайный)	1 неделя	Детям с 12 лет и взрослым по 1 ч.л. 3 раза в день, взрослым с массой тела > 70 кг по 2 ч.л. 3 раза в день. Детям возрастные дозировки см. в инструкции
	или Танаксол-форте		По 1 капсуле 3 раза в день
	*Токсидонт-май (Экстракт корня лопуха)	1 неделя	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды

3. **Восстановительный	*Ахиллан	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Гепатосол	3 недели	По 1ч.л. 3 раза в день
	*Ширлайн	2 недели	Дюбажи 1-2 раза в неделю
	Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
	Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание:

* - основные средства.

При тяжелой степени инвазии танаксол необходимо сочетать с синтетическими противоямблиозными препаратами.

****На 3 этапе в схему включить энтеросорбент в течение 4-5 дней вечером на ночь через 2 часа после еды.**

Контрольные анализы провести через 1 месяц после окончания курса (3-хкратно кал на яйца простейших).

При наличии желчекаменной болезни обязательна консультация с лечащим врачом. Рекомендуется применять продукцию на сорбите. При необходимости, по согласованию с врачом возможно проведение 2-3 повторных курсов приема Танаксол с интервалом в 3-5 дней, а также пролонгированных курсов до 14-21 дня непрерывного приема средства.

Общие рекомендации

- Соблюдать диету: исключить сладкое, выпечку, колбасные изделия, консервы, пряности. Употреблять кисломолочные продукты, отварное мясо, свежие овощи.
- Соблюдать режим рационального питания.

Рекомендуемое количество средств по схеме

АХИЛЛАН (90 г)2 УПАКОВКИ
 ГЕПАТОСОЛ (90 г)1 УПАКОВКА
 ТАНАКСОЛ (42 г) или
 ТАНАКСОЛ ПЛЮС (42 г) или
 ТАНАКСОЛ-ФОРТЕ1 УПАКОВКА
 ТОКСИДОНТ-МАЙ или
 ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА
 (75 мл)1 ФЛАКОН
 ШИРЛАЙН (120 г)1 УПАКОВКА
 ФЛОРЕНТА (50 мл)6 ФЛАКОНОВ
 или (200 мл)2 ФЛАКОНА
 ВИТАМИКС (120 г)2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (на фоне медикаментозной терапии)

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Популин с дигидро-кверцетином (Популин напиток чайный)	4–12 недель	Взрослым по 1 чайной ложке (детям 4-7 лет -1/3, 7-12 лет- 2/3 от дозы взрослого) 3 раза в день
*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 р. в день
*Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
*Флорента спрей	постоянно	Распылять в помещении 2–4 раза в день
Токсидонт-май (Экстракт корня лопуха)	2–4 недели	По 0,5 ч.л. 3 раза в день (растворив в 100 мл воды)
Рейши - Кан	4–6 недель 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Использовать специальные схемы питания для больных туберкулезом.
- Не переохлаждаться.
- Исключить алкоголь и курение.
- Ежедневно гулять на свежем воздухе, желательно в хвойном бору.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ПОПУЛИН с дигидрокверцетином (75 мл) 4–12 ФЛАКОНОВ
или ПОПУЛИН с дигидрокверцетином (200 мл) или ПОПУЛИН напиток чайный (200 мл) 2–6 ФЛАКОНОВ
ГЕПАТОСОЛ (90 г) 2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)
или ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА (75 мл) 1–2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА (200 мл) 2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА спрей (50 мл) 6 ФЛАКОНОВ
РЕЙШИ-КАН (100 г) 1–2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Эсобел гранулы	3–4 недели	Наружно в виде ванночек, примочек, компрессов 1–2 раза в день
*Крем «Эсобел» с экстрактом сабельника	3–4 недели	Растирать пораженную область 1–2 раза в день
*Эсобел с экстрактом сабельника или Кальций-Биолит	3–4 недели 4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день во время еды По 2 капсулы 3 раза в день
Флорента крем	3–4 недели	Растереть пораженную область, сухое тепло на ночь
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст. л. 3 раза в день
Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Экорсол+	2–3 недели	По 1 ч. л. 3 раза в день
Скипидарные ванны	2 курса в год	Смешанные, 10–15 процедур, с интервалом в 2 дня

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Исключить большие физические нагрузки.
- Снизить массу тела до оптимального уровня.
- Исключить острые приправы и ограничить потребление соли.
- Включить в рацион больше свежих фруктов и овощей.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА (120 г) 1–2 УПАКОВКИ или КАЛЬЦИЙ-БИОЛИТ (90 капсул) 2 УПАКОВКИ
 КРЕМ ЭСОБЕЛ (50 мл) 1 УПАКОВКА
 ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г) 1 УПАКОВКА
 ФЛОРЕНТА КРЕМ (30 мл) 1 УПАКОВКА
 ФЛОРЕНТА (200мл) 2 ФЛАКОНА
 ЭКОРСОЛ+ (42 г) 2–3 УПАКОВКИ
 ВИТАМИКС (120 г) 2 УПАКОВКИ
 СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ № 1 и № 2 по 1 ФЛАКОНУ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (НЕВРИТЫ, РАДИКУЛИТЫ)

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Эсобел гранулы	8–10 процедур	Электрофорез (или в сочетании с инфракрасным излучением)
Флорента крем или Крем Эсобел с сабельником	2–3 недели	2–3 раза в день на пораженную область
Скипидарные ванны (в восстановительный период)	12–15 процедур	Смешанные ванны, принимать через 2 дня на третий
Флавигран	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Эсобел с экстрактом сабельника или Эсобел-Арт	3–4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день во время еды По 2 капсулы 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Избегать физических нагрузок и переутомления.
- Уменьшить количество потребляемой соли.
- Активно заниматься лечебной гимнастикой.
- Использовать в питании больше свежих овощей и фруктов.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ФЛАВИГРАН (120 г)2 УПАКОВКИ
 ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г) 1 УПАКОВКА
 КРЕМ ФЛОРЕНТА (30 мл)2 УПАКОВКИ
 или ЭСОБЕЛ КРЕМ (50 мл)2 УПАКОВКИ
 СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ
 № 1 и № 2 по 1 ФЛАКОНУ
 ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ
 САБЕЛЬНИКА (120 г)
 или ЭСОБЕЛ-АРТ
 (90 капсул)2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН

СРЕДСТВО	ДЛИТ. ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Уролизин+ или Уролизин-форте	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
*Простадонт или Эсобел с экстрак- том сабельника	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
*Токсидонт - май (Экстракт корня лопуха)	3–4 недели	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
Экорсол+	1–2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Эсобел гранулы	1–3% раствор	Электрофорез на 10-14 день от начала терапии
Скипидарные ванны	10–15 проце- дур	Смешанные, на 10-14 день от начала лечения

Примечание: * – основные средства.

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Не переохлаждаться.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ТОКСИДОНТ–МАЙ или ЭКСТРАКТ
КОРНЯ ЛОПУХА (75 мл)..... 2-3 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
УРОЛИЗИН+ (120 г)2 УПАКОВКИ
или УРОЛИЗИН-ФОРТЕ 1-2 УПАКОВКИ
ПРОСТАДОНТ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ
САБЕЛЬНИКА (120 г)2 УПАКОВКИ
ЭКОРСОЛ+ (42 г)1–2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г)2 УПАКОВКИ
ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г) 1 УПАКОВКА
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ (250 мл)
№ 1 и № 2 по 1 ФЛАКОНУ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

ПЕРИ- ОД	СРЕДСТВО	ДЛИТ. ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Острый период	*Эсобел с экстрактом сабельника	1–4 неде- ли	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Популин с дигидрокверцетином (Популин напиток чайный)	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Простадонт	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	Флорента	6–8 недель	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
Период выздоровления	Эплир гель	10–12 про- цедур	Физиолечение ультразвуком, интравагинально
	*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
	*Витасел	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	Скипидарн. ванны (на 10–14 день)	8–10 сме- шанных	Принимать через день, обязателен контроль АД

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Наблюдаться в период обострения у гинеколога.
- Не переохлаждаться.
- Соблюдать правила личной гигиены.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ПРОСТАДОНТ (90 г)2 УПАКОВКИ
ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ
САБЕЛЬНИКА (120 г) 1-2 УПАКОВКИ
ПОПУЛИН с дигидрокверцетином
(75 мл)2 ФЛАКОНА
или ПОПУЛИН напиток чайный
(200 мл)1 ФЛАКОН
ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
ВИТАСЕЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
ЭПЛИР гель (20 мл)2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (50 мл)6 ФЛАКОНОВ
или ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ
(250 мл) № 1 и № 2 по 1 ФЛАКОНУ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Токсидонт–май или Семена лопуха	6–8 недель, 3 курса в год	По 0,5–1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды По 3 капсулы 3 раза в день
Витасел	4 недели, 1–2 курса год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст. л. 3 раза в день
Ахиллан или Ахиллан-форте (при наличии обильных менструаций)	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Придерживаться базового лечения у гинеколога.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ТОКСИДОНТ-МАЙ

(75 мл).....8-12 ФЛАКОНОВ
или СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 КАПСУЛ) 2-3 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (50 мл)6 ФЛАКОНОВ
или ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
АХИЛЛАН (90 г)2 УПАКОВКИ
или АХИЛЛАН-ФОРТЕ..... 1 УПАКОВКА
ВИТАСЕЛ (90 Г)2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КЛИМАКСА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Климатон (при повышенном и нормальном АД) или *Климатон плюс (при пониженном АД)	4–6 недель, 3 курса в год	По 1 чл. 3 раза в день
Венорм гранулы или Венорм-форте	4–6 недель, 3 курса в год	По 1 чл. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день
Гель Блаженство или гель Эплир	при дискомфортных состояниях в области наружных половых органов	По необходимости
Витасел	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 чл. 3 раза в день
*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 чл. 3 р./день По 1 капс. 3 р./день
Кальций-Биолит	4–6 недель	По 2 капсулы 3 раза в день
Токсидонт-май с пассифлорой и фитомелатонином	2-3 недели	1 саше за 1,5-2 часа до сна

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Регулярное наблюдение гинеколога.
- Обследование на остеопороз.
- Контроль за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы крови.
- Контроль веса, поддержка его на оптимальном уровне.

Рекомендуемое количество средств по схеме

КЛИМАТОН (90 г) 2-3 УПАКОВКИ
 КЛИМАТОН ПЛЮС (90 г) ... 2-3 УПАКОВКИ
 ВИТАСЕЛ (90 г) 2-3 УПАКОВКИ
 ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г) 2 УПАКОВКИ
 или ВЕНОРМ-ФОРТЕ 1-2 УПАКОВКИ
 КАЛЬЦИЙ-БИОЛИТ (90 капсул) 2 УПАКОВКИ
 ГЕПАТОСОЛ (90 г) 2 УПАКОВКИ
 или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
 ТОКСИДОНТ-МАЙ С ПАССИФЛОРОЙ И ФИТОМЕЛАТОНИНОМ 2 УПАКОВКИ
 БЛАЖЕНСТВО гель или ЭПЛИР гель по необходимости

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ У МУЖЧИН
(хронический простатит,
аденома простаты, бесплодие,
заболевания почек, мочевого пузыря)**

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Простадонт	4 недели**	По 1 ч.л. 4 раза в день
*Экорсол+ или Популин с дигидро- кверцетином	1–3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
*Поликавин (после Простадонта)	10 дней**	По 1 ст.л. 1 раз в день
	4–12 недель (при мужском бесплодии)	по 1 ст.л. 1 раз в день
*Уролизин+ или Уролизин-форте	4 недели**	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день

Примечание:

* - основные средства.

** – не применять при наличии крупных конкрементов (более 0,5 мм) в почках, мочевом и/или желчном пузыре.

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Не переохлаждаться.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

**Рекомендуемое количество
средств по схеме**

ПРОСТАДОНТ (90 г)3 УПАКОВКИ
 ЭКОРСОЛ+ (42 г)1–3 УПАКОВКИ
 или ПОПУЛИН с дигидро-кверцетином
 (75 мл)1–3 ФЛАКОНА
 УРОЛИЗИН+ (120 г)2 УПАКОВКИ
 или УРОЛИЗИН-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
 ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА
 ПОЛИКАВИН (110 г) 1 УПАКОВКА

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Средство	Длительность приема	Схема приема
*Токсидонт-май или Семена лопуха	4–12 недель, 2–3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Витасел (как профилактическое средство)	4 недели	По 1 ч.л. 2–3 раза в день
*Рейши - Кан	4–12 недель, 2–3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Гепатосол или Гепатосол-форте или Липроксол	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели, 3 курса в год	По 1 ст.л. 3 раза в день
*Мамавит гель или Мамапренол гель (при мастопатиях у женщин)	4 недели, 2–3 курса в год	Местно, на область молочных желез, 1–2 раза в день

Примечание: * - основные средства

Общие рекомендации

- Регулярно, 1 раз в год, проходить профилактические осмотры (осмотр гинеколога (женщины) или андролога-уролога (мужчины), флюорография, ЭГДС и т.д.).
- Строго соблюдать рекомендации лечащего, наблюдающего врача.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ТОКСИДОНТ-МАЙ

(75 мл)..... 4–12 ФЛАКОНОВ
или СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 капс.)..... 1 УПАКОВКА
ВИТАСЕЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
РЕЙШИ - КАН (100 г)2–6 УПАКОВОК
ГЕПАТОСОЛ2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
или ЛИПРОКСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
МАМАВИТ ГЕЛЬ или МАМАПРЕНОЛ ГЕЛЬ
(50 мл)2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)2 ФЛАКОНА

*Возможна вариация дозировок
и длительности приема по рекоменда-
ции Вашего консультанта*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МАСТОПАТИИ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Семена лопуха капсулы	4 недели, 3 курса в год	По 3 капсулы 3 раза в день
*Токсидонт-май	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
*Мамавит гель или Мамапренол	4 недели, 3 курса в год	Местно, на область молочных желез, 2 раза в день
*Венорм или Венорм-форте	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства

Все рекомендуемые БАД применяются одновременно!

Общие рекомендации

- Своевременно проходить маммологическое обследование.
- Избегать переохлаждения.
- Избегать избыточной инсоляции.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Рекомендуемое количество средств по схеме

СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 капсул)2 УПАКОВКИ
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)4 ФЛАКОНА
ВЕНОРМ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ВЕНОРМ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
МАМАВИТ ГЕЛЬ или МАМАПРЕНОЛ
(50 мл)2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок
и длительности приема по рекоменда-
ции Вашего консультанта.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Семена лопуха	4 недели	По 3 капсулы 3 раза в день
*Токсидонт-май	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
*Гепатосол или Гепатосол-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день
*Простадонт	4 недели	По 1 ч.л. 4 раз в день
*Уролизин+ или Уролизин-форте	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 капс. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Избегать переохлаждения.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

Рекомендуемое количество средств по схеме

ПРОСТАДОНТ (90 г)2 УПАКОВКИ
УРОЛИЗИН+ (120 г)2 УПАКОВКИ
или УРОЛИЗИН-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА
ТОКСИДОНТ-МАЙ4 ФЛАКОНА
СЕМЕНА ЛОПУХА
(190 капсул)2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)2 УПАКОВКИ
или ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ 1 УПАКОВКА

*Возможна вариация дозировок
и средств по рекомендации Вашего
консультанта.*